

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Травы с очередными, часто расчлененными листьями без прилистников; цветки обычно обоеполые, околоцветник простой, лепестковидный или расчленен на чашечку и венчик, тычинки и пестики в неопределенном числе, плод — многолистовка или многоорешек.

1. Листочки околоцветника белые или бледно-зеленые, не опадающие. Листья пальчаторассеченные, кожистые, зимующие. Плод — многолистовка Морозник кавказский (*Helleborus caucasicus* A. Br.)
— Признаки иные 2.
2. Околоцветник простой, венчиковидный 3.
— Околоцветник двойной 4.

- 3. Листочков околоцветника 5, желтых
 Ветреница лютичная (*Anemone ranunculoides* L.)
- Листочков околоцветника больше 5, голубых или синих
 Ветреница нежная (*Anemone blanda* Schott & Kotschy)
- 4 (2). Листья цельные, чашелистиков 3. Растение голое
 Чистяк калужницелистный (*Ficaria verna* Reichenb.)
- Листья рассеченные. Чашелистиков 5 (иногда опадают после того, как
 цветок раскрылся) 5.
- 5. Растение густо опушено мягкими, шелковистыми волосками. Цветоло-
 же голое
 Лютик крупноцветковый (*Ranunculus grandiflorus* C.A. Mey.)
- Растение слабоопушенное. Цветоложе покрыто волосками
 Лютик каппадокийский (*Ranunculus cappadocicus* Willd.)

Указатель русских названий родов

Ветреница, 2

Лютик, 2

Морозник, 1

Чистяк, 2